

注射顯影劑檢查後注意事項

- 1.針拔除後請加壓止血 3-5 分鐘，勿揉，以免瘀血腫脹。
- 2.檢查結束後可立即進食。
- 3.極少部份人會有遲發性過敏發生，如回家後發現蕁麻疹或身體不明原因發癢時，上班時間請與本單位聯絡，若於下班後或情況嚴重時請先立刻掛急診處理。
- 4.若出現全身倦怠、尿量減少、水腫、食欲不振、噁心、嘔吐、意識不清等「尿毒」的症狀，可能產生含碘顯影劑腎病變，請先立刻掛急診處理。
- 5.()您此次的腎絲球過濾率 $\geq 45 \text{ mL/min/1.73 m}^2$ ，檢查後若無任何不適，請於一週後，自行約掛原門診看檢查結果。
()您此次的腎絲球過濾率為_____ mL/min/1.73 m^2 ，(或有充血性心臟病、六週內傳統開腹手術)。有含碘顯影劑腎病變風險(施打含碘顯影劑三天內，在無其他原因下，腎功能變差達到血清肌酐增加 0.3 mg/dL 以上或增加為原血清肌酐數值之 1.5 倍（含）以上。)，經您的開單醫師評估，因病情需要，且取得您(或家屬)同意後，已完成注射顯影劑檢查。請於注射含碘顯影劑後 48 - 72 小時回診確認腎功能。

聯絡電話 02-29307930 轉 1301

平日 21:00 及星期六 12:30 以後和假日請轉 1323