




## Eraflu® 易剋冒 / Tamiflu® 克流感 口服懸浮液配置

【成分】每粒膠囊含 Oseltamivir 75mg

【治療劑量】每天 2 次，療程 5 天

【適應症】預防或治療流行性感冒


### 口服懸浮液配製方法 (每毫升 15 毫克劑量)



將膠囊剪  
開或剝開



將藥粉倒  
入容器中



加冷開水  
慢慢溶解  
至 5 毫升



攪拌至均  
勻混合

### 1 歲以上兒童劑量參考

使用劑量請遵照醫師處方

| 體重         | 建議劑量  | 服用懸浮液 |
|------------|-------|-------|
| ≥ 40 公斤    | 75 毫克 | 5 毫升  |
| 24 – 39 公斤 | 60 毫克 | 4 毫升  |
| 16 – 23 公斤 | 45 毫克 | 3 毫升  |
| ≤ 15 公斤    | 30 毫克 | 2 毫升  |

\* 未滿 1 歲嬰幼兒劑量請參考背面

### 【注意事項】

- 每次服用前請先充分均勻混合懸浮液，配置完成後請盡速服用完畢。
- 若有些許藥粉殘留容器中，請以少量的水搖晃沖洗並讓病人把殘餘混合物喝完。





### 【忘記服藥與吐藥指示】

- 如忘記服藥，請盡快補服；若離下一次服藥時間小於 2 小時，請跳過此劑並於常規時間服用下一劑，請勿同時服用 2 倍劑量。
- 如服藥 30 分鐘內有吐藥反應，請補服一劑藥物劑量。

### 未滿 1 歲嬰幼兒劑量參考

使用劑量請遵照醫師處方

| 體重    | 建議劑量  | 服用懸浮液  |
|-------|-------|--------|
| 10 公斤 | 30 毫克 | 2.0 毫升 |
| 9 公斤  | 27 毫克 | 1.8 毫升 |
| 8 公斤  | 24 毫克 | 1.6 毫升 |
| 7 公斤  | 21 毫克 | 1.4 毫升 |
| 6 公斤  | 18 毫克 | 1.2 毫升 |
| 5 公斤  | 15 毫克 | 1.0 毫升 |
| 4 公斤  | 12 毫克 | 0.8 毫升 |
| 3 公斤  | 9 毫克  | 0.6 毫升 |

