


Exelon® 憶思能穿皮貼片

【藥物效用】


失智症用藥

【使用部位】


每天在以下各部位中擇一貼上一片貼片




【使用方法】



1. 沿虛線剪開封袋，打開後取出貼片。保留封袋稍後使用。剪切時避免損及貼片或過度凹折貼片。



2. 貼片的黏性面覆蓋有保護襯片。將保護襯片的一邊剝開。請勿讓您的手指碰觸貼片的黏性面。



3. 將保護襯片的另一邊剝開。



4. 按緊貼片，確保各邊緊密黏附。
5. 貼上貼片後，用肥皂和清水洗淨雙手。

【摘除方法】

1. 輕輕掀起貼片的一側，自皮膚上摘除，將貼片對折，放回之前留下的封袋後丟棄，丟棄地點應遠離兒童及寵物。
2. 立即以肥皂和清水洗淨雙手。

【注意事項】

1. 每日需更換不同黏貼部位。
2. 貼上新的貼片之前，請務必先除下前一天的舊貼片。
3. 請勿以接觸憶思能貼片的雙手碰觸您的雙眼。
4. 貼片應貼在乾淨、乾燥、無毛且無損傷的皮膚上，並避免貼在會與貼身衣物造成摩擦的身體區域。
5. 勿憶思能貼片貼在發紅、過敏或帶有傷口的皮膚上。
6. 勿憶思能貼片貼在塗有乳霜，乳液或撲粉的皮膚上。
7. 每天同一時間，每 24 小時更換一次您的貼片。
8. 您可以貼在相同的區域，但同一個貼附點距離上次貼附的日期應至少相隔 14 天。
9. 若您漏貼一劑或忘記更換您的貼片，請於記起時立刻貼上下一片，請勿為了補貼而同時貼上2片貼片。
10. 請避免接觸外部熱源，例如過度日曬、蒸汽浴或長時間的日光浴。

【警語】

1. 若使用本藥後發生噁心、嘔吐、食慾降低、頭暈、黏貼部位發紅、搔癢等症狀，請立即停用並接受醫師診治。
2. 憶思能貼片會導致困倦、眩暈、虛弱或昏暈。在瞭解貼片對您的影響之前，請勿駕駛或操作重型機械或從事其他高風險性活動。
3. 若您不慎同時使用兩片以上憶思能貼片，請聯絡醫護人員，如感身體不適立刻前往最近醫院的急診室。

【儲存環境】

1. 將貼片存放在 25°C 以下。
2. 準備使用貼片前，一律將貼片存放於密封的封袋內。