



吩坦尼穿皮貼片劑

Fentanyl transdermal patch

【適應症】

需要使用類鴉片製劑控制的慢性疼痛和頑固性疼痛。
穿皮貼片劑能提供持續 72 小時的 fentanyl 全身釋放。

使用前準備

- 於軀幹或上臂處找一塊無刺激及放射線照射 (不會照到太陽光)，且較無毛髮的**平整皮膚表面**，作為貼藥部位 (而非疼痛部位)。
- 將貼藥部位毛髮剪除，勿使用刮除的方式除毛。
- 年紀較小的孩童，建議選擇上背部皮膚，降低被孩童自行移除的機會。
- 若欲清潔貼藥部位，只能用**清水潔淨**。
- 貼上貼片前，應使**皮膚完全乾燥**。

使用方法

1

取出貼片
(取出後應**立即使用**)




2

將貼片保護層移除
(避免碰觸黏著層)

3

將貼片貼上皮膚
用手掌用力**緊壓 30 秒**
確保貼片**完全與皮膚接觸**
注意角落部位應緊密黏貼



請勿切割或撕裂貼片！

如上圖所示之平整
皮膚表面皆可黏貼





使用後處置

- 使用過的吩坦尼穿皮貼片劑，應對折黏好後放入原包裝，並**繳回 (醫院) 藥局銷毀**，請勿自行丟棄。
- 如有未曾使用剩下的貼片應**退還給 (醫院) 藥局**。
- 貼上貼片後或移除貼片後，只能用**清水洗手**。

注意事項

- 請配合填寫使用紀錄表 (需註明貼片使用起迄時間)，並於繳回舊片時一併交給 (醫院) 藥局。
- 吩坦尼穿皮貼片劑無論使用前後，皆應該放置於孩童無法輕易接觸的地方。
- 一個吩坦尼穿皮貼片劑可連續使用 72 小時 (三天)，三天後需更換貼片。
- **貼片黏貼部位需輪替**，新的貼片要貼在與前一片不同的位置。同一部位的皮膚必須相隔 14 日才可以再貼上新貼片。
- 洗澡選擇淋浴，避免泡澡、泡溫泉或接觸熱源，以免影響藥品的吸收。

【副作用】

1. 常見副作用：噁心、嘔吐、暈眩、嗜睡、便秘，若上述症狀持續或惡化，請聯絡您的醫師或藥師。
2. 若發生呼吸困難、昏昏欲睡且呼吸變慢、精神恍惚或其他不尋常症狀時，請立即聯絡您的醫師或藥師。

