

疥瘡、蝨 感染相關用藥 衛教單張

□ Jaline 25% lotion 疥寧

□ Permethrin 5% cream

【使用方法】

□ 成人

- 
1. 全身從頸部以下至腳底皆要塗抹 (包括非病灶處)，常忽略處如：耳後、腋下、生殖器、肚臍及指甲縫都要塗抹，注意需避開黏膜處。

Jaline

- ✓ 洗完澡擦乾後，即可塗抹藥品
- ✓ 使用前先振搖藥液
- ✓ 停留 24 小時後，以溫水和肥皂洗去藥物
- ✓ 至少連續使用三天，依照醫囑可延長使用天數

Permethrin

- ✓ 洗完澡擦乾後，須等 60 分鐘，體溫恢復正常後再塗抹藥品
- ✓ 停留 8 - 12 小時後，以溫水和肥皂洗去藥物
- ✓ 依照醫囑可於一周後重複療程

□ 幼童：

- 
1. 使用方法同成人，惟塗抹完畢後，請幫幼童戴上手套，以避免雙手觸碰眼、口、鼻等黏膜處。

Jaline

- ✓ 國小以下幼兒：請 1:1 稀釋使用
- ✓ 1 歲以下嬰兒：請 1:2 稀釋使用

Permethrin

- ✓ 頭皮與臉部皆可塗抹，注意須避開眼、口、鼻等黏膜處

【副作用】


1. 皮膚可能會有輕微刺激反應，如未改善或加劇，請告知醫師。
2. 疥蟲感染患者於治療後，搔癢症狀可能持續 2-3 週，此為正常現象並非治療失敗。若有需要，可請醫師給予止癢藥物。

【同住者及環境物品處理原則】

1. 疥蟲和蝨會經由人體接觸傳染，所以建議感染病患的親密接觸者皆須同時接受治療。
2. 發病期間請避免與人共用毛巾、衣物、床單、請勿到公共場所過夜(例：旅館)。
3. 在一般情況下，疥蟲離開人體皮膚存活不能超過兩到三天。故需更換衣物及床具，並依據下列方式隔離或消毒，以避免再次感染。

隔離法

- ✓ 放入塑膠袋密封靜置
至少一周後清洗乾淨



消毒法

- ✓ 60°C 以上熱水煮 20 分鐘後清洗乾淨

