

雙磷酸鹽類藥品或其類似藥品

【藥品種類】

- 口服：Alendronate 善骨實膜衣錠、Bonafos 骨復舒膠囊
- 針劑：Prolia 保骼麗注射液、Xgeva 癌骨瓦注射液、Aclasta 骨力強注射液、Keybone 吉利康注射液、Zobonic 抑骨凍晶靜脈注射液、Pamisol 裴米索注射液

【適應症】

治療或預防骨質疏鬆、癌症造成之骨頭疼痛或骨轉移、高血鈣

【藥物作用】

抑制蝕骨細胞的活性，降低骨代謝速率，減少骨骼崩壞

【注意事項】

使用雙磷酸鹽類或其類似藥品造成**下顎骨壞死的案例很罕見**，為預防此副作用發生，需特別注意以下事項：

1. **初次使用前，建議您先至牙科進行完整口腔檢查及評估。**若需進行拔牙或口腔手術，請於開始用藥前二至三週完成，若因臨床狀況急迫需先用藥，請參照以下注意事項。
2. 用藥期間若需進行拔牙或口腔手術，務必讓牙醫師知道您有使用此藥，由醫師評估是否需要停藥，及停藥多久才能進行拔牙或口腔手術。
3. 平常需**注意口腔清潔**，預防蛀牙及牙周病發生：
 - ✓ 飯後要刷牙漱口
 - ✓ 多利用漱口水，以抑制細菌滋生。
 - ✓ 若有活動性假牙，請多利用假牙清潔劑清潔。
 - ✓ 活動性假牙裝卸時要小心避免傷口產生。
4. 為維護口腔健康，建議戒菸及控制飲酒量。
5. 建議**每三至六個月**徹底清除牙結石及潔牙，並且做一次口腔檢查。

【立即回診】

若有下列**下顎骨壞死可能症狀**，請立即回診告知醫師或藥師：

- ✓ 上下顎骨感覺異常、麻木、疼(脹)痛、紅腫
- ✓ 味覺異常
- ✓ 牙齒鬆動