

里先安[®]膜衣錠 (Lixiana)

姓 名： _____ 血 型： _____
生 日： _____ 性 別： _____
身 高： _____ 公分 體 重： _____ 公斤
過敏史： _____

一. 里先安小檔案

- 里先安是一種抗凝血劑，成分為 edoxaban
 - 用來降低心房顫動病人發生中風的風險
 - 用來治療血栓症，包含深部靜脈血栓與肺栓塞

二. 使用本藥之前，若您有以下疾病或情況，請務必告知您的醫師和藥師！

- 出血疾病或問題（例如：消化道潰瘍、黑便等）
- 肝腎功能問題
- 正在服用其他抗血栓藥物（例如：aspirin、warfarin）
- 懷孕或哺乳
- 需要或準備進行手術（例如：拔牙、開刀）

三. 如何使用本藥？

- 固定時間，空腹或飯後服用均可
- 可磨碎錠劑，溶解於60-90毫升開水，立即服用
- 除非醫師指示，請勿自行停藥，以免增加血栓產生的風險

里先安[®]膜衣錠 (Lixiana)

四. 忘記服藥該怎麼辦？

- 同一天內應儘速服用
- 隔日應於原本相同時間繼續每天服用一次，不得於同一日服用兩倍的處方劑量做為彌補漏服的劑量

五. 服藥過後，若出現以下情況，請告知您的醫師和藥師，緊急情況時請盡快就醫！

- **出血**：無原因鼻血不止、牙齦流血不止、尿液呈紅色或深褐色、黑便、月經量異常增多、傷口流血不止、咳血、不明原因瘀青/紫斑
- **栓塞**：頭昏眼花、突然說話不順、臉歪、流口水、突然胸痛、突然呼吸困難或劇烈咳嗽、突然手或腳無力、四肢腫脹或劇痛、身體任何地方麻痺或刺痛且惡化

★注意：

- 里先安[®]可能與藥品、保健食品、中草藥產生交互作用，使用前應告知醫師和藥師您目前正在服用的藥品、保健食品、中草藥！
- 服用里先安[®]期間，請避免可能會造成跌倒、受傷或出血的危險活動。

衛教影片請掃描
QR CODE



萬芳醫院藥劑部 關心您的健康
電話 (02) 2930-7930 #1138