




尼古丁貼片 用藥指引

- ☐ Smokfree 淨菸貼片
- ☐ Nicotinell 克菸貼片

【適應症】

作為戒菸輔助劑，由貼片釋放出的尼古丁可維持 24 小時，用以緩解戒菸產生的戒斷症狀與降低對尼古丁渴求。

【使用方法】



可用剪刀或以撕開的方式打開包裝，移除貼片保護層



貼在清潔、乾燥、完整的皮膚上，並用手掌輕壓 10 秒



請黏貼於胸部、背部、上臂、腹部等乾淨無毛的部位



使用完畢後請對摺妥善丟棄





【注意事項】

- 為減少對皮膚的刺激，**每日需更換不同黏貼部位**。相同黏貼部位應至少**間隔 7 天**。
- 貼完貼片後**請用清水洗手**，以避免手指上的尼古丁刺激到眼睛或鼻子。
- 貼片為鋁箔材質，若使用期間需進行磁振造影 (MRI) 檢查，須先撕去貼片，避免檢查過程中過熱而造成皮膚灼傷。
- 使用本藥時絕對**禁止吸菸**，以免尼古丁過量而發生中毒現象。
- 使用本藥不宜超過三個月，過長時間吸收尼古丁可能導致成癮。

【副作用】

- 睡眠時使用尼古丁貼片可能會有多夢、淺眠、睡不著的現象，此大多為戒斷症狀，幾週後就會改善。
- 若使用本藥後發生血壓上升、心跳加快、心絞痛等症狀，請立即停用並聯絡您的醫師或藥師。

