


Ozempic® (Semaglutide) 胰妥讚 注射劑

【使用方法】


1.



✓ 檢查/消毒

- A. 確認注射筆中的溶液是不是**透明無色**。若為混濁或變色，請勿使用。
- B. 以酒精棉片消毒筆頭。

2.



✓ 裝上針頭

- A. 撕下保護片。請勿使用破損的保護片，因無法確認針頭無菌狀態。
- B. 將針頭筆直裝上注射筆並旋緊。
- C. 取下針頭外蓋，置於一旁備用。
- D. 取下針頭內蓋並丟棄。

★ 每次注射都必須使用新的針頭

3.



✓ 排空

- A. **第一次使用全新**的注射筆前，請先排空。轉動劑量設定鈕至排空檢查符號 (**0**)
- B. 針頭朝上，垂直握著筆身，按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示為 0，同時針尖應該會看到一滴溶液。

★ 第一次使用前，**務必確認針尖看到一滴溶液**，才代表確實排空。如果無，請重複排空步驟；若還是沒有，請更換針頭


4.



✓ 設定劑量

轉動劑量設定鈕至您的處方劑量。
若選錯可回轉，切勿計算「喀擦聲」的次數。


5.



✓ 進行注射

- A. 將針尖垂直刺入皮膚。
- B. 按住給藥按鈕，直到劑量計數器顯示 0，可能會聽到喀擦聲。
- C. 針尖不要拔出，**慢慢默數到 6**，以確保劑量完整注入。
- D. 將針頭從皮膚拔出，若有出血，請輕輕按壓，不要搓揉。

6.




✓ 移除針頭

- A. 將針頭外蓋套入針頭，請勿雙手回套以避免扎到自己。
- B. 蓋緊外蓋後，旋轉取下針頭，裝入回收瓶。
- C. 將筆蓋套回，以避免光線照射藥品。

【注射部位】

最適合注射的部位為**大腿、腹部或上臂**



【保存方式】

- ✓ 使用前：請存放於冰箱冷藏 (2°C - 8°C)
- ✓ 使用中：請存放於 30°C 以下或冰箱冷藏 (2°C - 8°C)，
保存期限為 6 周

【注意事項】

1. 每周注射一次，可在一天中的任何時間注射，不論是否進食。
2. 如果錯過注射日期，應在 5 天內 盡快施打。如果超過 5 天則應跳過，依照原訂時程施打下一劑。
3. 必要時可改變每周注射日期，但兩次注射之間應至少 相隔 3 天 (超過 72 小時)。

