



平舒疼口頰溶片 用藥指引 PAINKYL® (Fentanyl 200mcg)

【適應症】

用於 18 歲 (含) 以上且正在使用類鴉片藥物治療持續性癌症疼痛並具耐受性者 之 突發性疼痛 (breakthrough pain) 緩解。

正確打開 PAINKYL 包裝的方法

1. 除非已預備使用，否則請勿打開包裝。
2. 於鋁箔包背面，以剪刀沿著虛線 (有效日期上方) 剪開。
3. 將鋁箔包的兩層剝開，取出 PAINKYL 貼片。

 請勿切割或撕裂 PAINKYL 貼片！



正確使用 PAINKYL 的方法

1. 用舌頭或白開水濕潤您的口腔內壁。
2. 將粉紅面朝上，貼片放置到口腔中，讓粉紅面貼附於濕的口腔內壁，並按壓 5 秒以固定貼片。
5. 貼片黏附於口腔內壁 5 分鐘後，即可飲用液體。
6. 貼片溶散通常需 15 – 30 分鐘，溶散前請避免碰觸或移動貼片，且勿食用任何食物。
7. 若依照醫師指示需同時使用超過一片的 PAINKYL 貼片，請勿將貼片疊放，貼片可置放於口腔內的任意一側。

粉紅面朝上



 請勿咀嚼或吞下 PAINKYL 貼片！

【副作用】

1. 常見副作用：噁心、嘔吐、暈眩、嗜睡、便秘，若上述症狀持續或惡化，請聯絡您的醫師或藥師。
2. 若發生呼吸困難、昏昏欲睡且呼吸變慢、精神恍惚或其他不尋常症狀時，請立即聯絡您的醫師或藥師。

