

COVID-19 治療藥品服用須知

Paxlovid (Nirmatrelvir, Ritonavir)

☑ 為本次醫囑抗病毒藥物服用方式

建議劑量



第1天 → 第2天 → 第3天 → 第4天 → 第5天

一般劑量

☐ 每日**2**次, 每次**3**粒
持續5天療程

另一品牌名: R9
Ritonavir
3CL Nirmatrelvir PFE
(1粒白色+2粒粉色)

每日**早、晚**服用




◆黃色與藍色背板(藥片)內藥品組成相同◆

CKD-EPI 30-60

☐ 每日**2**次, 每次**2**粒
持續5天療程

1.71公分
R9
Ritonavir
1.76公分
PFE
另一品牌名: 3CL Nirmatrelvir
(1粒白色+1粒粉色)

每日**早、晚**服用



早上 晚上



◆黃色與藍色背板(藥片)內藥品組成相同◆

腎功能劑量調整
CKD-EPI < 30 (含洗腎)

☐ **第1天**
每日**1**次, 每次**3**粒
(1粒白色+2粒粉色)

第2-5天
每日**1**次, 每次**2**粒
(1粒白色+1粒粉色)

每日**一次固定時間**服用
(洗腎個案, 洗腎日調整至洗腎後服用)



◆黃色與藍色背板(藥片)內藥品組成相同◆

- ◆ 可空腹或隨食物服用
- ◆ 錠劑應整粒吞服, 管灌操作詳見後頁
- ◆ 請主動告知醫療人員您目前的用藥狀況, 以確保用藥安全

☞ Paxlovid可能與其他藥品有交互作用(如:影響藥品療效或濃度), 對此, 可透過相關監測或調整用藥提升用藥安全



請見下頁→

24小時藥物諮詢電話 (02) 2930-7930 分機1138

COVID-19 治療藥品服用須知

Paxlovid (Nirmatrelvir, Ritonavir)

• 忘記服藥怎麼辦？

- 若於8小時內發現忘記服藥，應盡快補服。
- 若超過8小時才想起，則不應補服。

例：常規安排每日早上9點及晚上9點服藥，如果早上9點忘了服用藥物，則傍晚5點前(8小時內)可補服早上劑量。

!漏服藥!

8小時內可補服遺漏劑量

已超過8小時
不補服遺漏劑量

晚上9點
請按時服藥
請勿服用兩
倍劑量

早上9點

假設早上9點漏服藥物
則傍晚5點前可補服早上劑量

傍晚5點

晚上9點

- 藥錠可能副作用：血壓升高、腹瀉、味覺改變(苦味)，肌肉痠痛等。若症狀輕微請勿停藥，以確保療效。
- 經管灌給藥配置建議

⚠ 管灌之準備及注意事項



鼻胃管 空針

- 鼻胃管尺寸與材質：使用 8FR 或更大管徑；PVC、silicone 或 polyurethane
- 需準備 20 ml 空針 (針筒 A、針筒 B)



5 mins

兩種藥物 (Nirmatrelvir、Ritonavir)
需 **分開** 製備懸浮液，
並間隔 **5 分鐘內** 服用



4 hr

懸浮液在室溫下可保存 **4 小時**，
勿超過此保存時間



2 hr

管灌 Paxlovid
(Nirmatrelvir/Ritonavir)
前後至少 **2 小時禁食** 任何食物

⚠ 管灌步驟

1

2 懸浮液準備

3

管灌與沖洗殘餘劑量



Nirmatrelvir 150 mg
(粉紅錠劑 2 錠)



Ritonavir 100 mg
(白色錠劑 1 錠)

錠劑
加入

磨粉
加入

針筒 A
15 ml
10 ml

針筒 B
15 ml
10 ml

針筒皆按照以下步驟執行：

1. 融於水 10 ml
吸取空氣至 15 ml
2. 上下搖晃 15 秒、
靜置 3 分鐘以利分解

⚠ 兩者藥物勿混合，前後給藥
間隔 **5 分鐘內**

1. 搖晃 1 分鐘，均勻混合
2. 給藥後，吸取 10 ml 水並上下
搖晃 15 秒，將殘藥給予完全
且將鼻胃管沖洗乾淨

此文件為簡化流程步驟，詳細可參照完整中文文件。