






□ Relvar® 潤娃

□ Trelegy® 肺樂喜


易利達乾粉吸入器 衛教單張

【使用方法】

- 1 
 - 在尚未開始使用吸入器之前，劑量計數器會顯示 30 劑
 - 請準備好要吸入藥品時，再進行下一步
 - 2 
 - 打開吸口蓋，會聽到「喀」聲，劑量計數器會減少 1
 - **注意！**當吸口蓋已經打開，為確保不浪費一劑藥物，尚未吸入藥物之前請勿關上吸口蓋
 - 3 
 - 緩慢吐出一大口氣，將肺內空氣排出 (請不要對著吸嘴吐氣)
 - 4 
 - 吸口放在雙唇之間，緊閉雙唇，緩而長的吸一口氣 (手指切勿擋住通氣孔)
 - 5 
 - 吸入器自口中移去，閉緊雙唇
 - 閉氣 5 - 10 秒
 - 6 
 - 關上吸入器，將吸口蓋向上滑動，直到蓋住整個吸口
 - 若有需要，吸口可使用乾面紙擦拭
- 此藥不適用於緩解急性症狀，不可為此而使用額外的劑量
 - 使用完畢後請用清水漱口或刷牙，以預防真菌感染

【剩餘劑量】

- 每次使用完畢請檢查劑量計數器的讀數是否減少。
- 當計數器顯示數字小於10時，劑量計數器的左邊會呈現紅色，您應準備回診取得新的吸入器。當計數器顯示為0時，請停止使用該吸入器。



【清潔與儲存】

- 建議**每週**以乾布或紙巾擦拭吸入器一次。
- 藥品自鋁箔包裝開封後，請保存於室內陰涼處 (25 °C 以下)，最長可存放 1 個月。