





MDI 定量噴霧吸入劑衛教單張

- Berotec® N 備勞喘 200噴/瓶
- Duasma® HFA 帝舒滿 200噴/瓶
- Seretide® Evohaler 使肺泰優氣 120噴/瓶

【使用方法】

	1. 移除保護蓋。
	2. 將吸入輔助器較粗一邊與噴霧液罐含口器接合。
	3. 每次使用前須<u>上下搖動噴霧液罐</u>。 註：<u>第一次使用前應先對空按壓兩次</u> (若為 Seretide 使肺泰，則需試噴至計數視窗顯示 “120” 才能開始使用)。
	4. 先<u>緩慢吐氣</u>，排除肺內空氣。
	5. 吐氣後，將吸入輔助器含於口中，<u>按壓藥罐</u>，<u>同時立刻以正常呼吸速度吸入</u>，<u>吸入後閉氣 5 - 10 秒</u>，移去吸入輔助器，慢慢呼吸。
	6. 如處方劑量要噴一次以上，<u>相隔 30 秒後</u> (Berotec 備勞喘 需<u>相隔 5 分鐘</u>，<u>且一天使用不超過 8 次</u>)，重複前述第 3 至 5 步驟。 7. 蓋回保護蓋。



【注意事項】

1. Duasma 帝舒滿 與 Seretide 使肺泰 使用完畢後請用清水漱口，以避免產生鵝口瘡。
2. Berotec 備勞喘 若超過三天未使用，需對空按壓 1 - 2 次後再開始使用。
3. Seretide 使肺泰 若超過一周未使用，需對空按壓 1 - 2 次後再開始使用。
4. 吸入劑必須至少一周清潔一次，以乾布、面紙、或棉布擦拭含口器與塑膠外殼之內外；吸入輔助器可以溫水及清潔劑或肥皂清洗後風乾。

【剩餘劑量】

1. Berotec 備勞喘 與 Duasma 帝舒滿 請用紙張紀錄使用之數量，接近用畢 200 噴時，請準備換新使用。Berotec 備勞喘 一旦開始使用，有效期限為三個月。
2. Seretide 使肺泰 之計數視窗顯示 “020” 時，應準備換新，顯示 “000” 時，一定需換新。

